

猪直肠脱出的治疗体会

陈贵华*

(曲靖市会泽县大海乡畜牧兽医站,大海 654201)

摘要:介绍了猪直肠脱出的病因、症状、治疗方法、术后管理、治疗结果和治疗体会,以供畜牧兽医工作者和养殖户参考。

关键词:猪;直肠脱出;诊治

直肠脱出是指直肠的部分或大部分外翻脱出于肛门外。笔者整复后使用烟包缝合法治疗猪直肠脱出 8 例,均获得良好效果,现将诊治方法简述如下,以供参考。

1 病因

由于肛门括约肌松弛,腹内压增高,努责过当而引起本病。多因饲养不当、慢性便秘、腹泻、难产、直肠炎等诱发。

2 症状

脱肛时在肛门后面出现暗红色半球状突出物,初期常能自行缩回,如经常性反复出现时,则粘膜发炎、水肿干裂、冷硬难收,水肿液流出并形成褐色纤维素薄膜附在表面;严重病例直肠脱出多似圆柱状,由肛门垂下,向下方弯曲,常发生粘膜损伤、感染、坏死或直肠破裂。严重时出现排便困难,不时努责,患畜精神沉郁,食欲减退。

3 治疗

脱肛或直肠脱出时,用高渗盐水或 0.1% 高锰酸钾溶液洗涤干净,然后用消毒沙布温水热敷后缓慢地把脱出的粘膜或直肠还纳于肛门内。在肛门周围施行烟包缝合,留出一指宽的排粪口便于排粪。7~10d 后拆除缝合线。

如脱出的直肠发生坏死或破裂时,可进行手术切除。术前进行神经麻醉,方法是在肛门和尾根之间的正中线上刺入针头,针头刺向一侧坐骨结节前方的坐骨切迹,当接触

到骨骼时,注射 2% 盐酸普鲁卡因溶液 5~10ml,在拔出针头前注射入 5~10ml。然后按同样方法,麻醉另一侧神经。然后对有重叠的肠管进行整复或切开脱出直肠的外壁,将粘连部剥离后整复,然后进行切除手术。切除时,首先清洗消毒脱出的肠壁,用消毒过的两根长封闭针头,靠近肛门穿过脱出的肠管,使两根针相互垂直成“十”字刺入已固定的肠管,在距固定针 1~2cm 处切除坏死的肠管,对环形的两层断端肠管施行相距 0.5cm 的结节缝合,缝合时因缝合针通过肠管易被污染,每缝一针后,必须对所用针进行消毒,缝合完毕后用 0.1% 高锰酸钾液冲洗。除去固定针,还纳直肠于肛门内。

4 术后管理

术后为减轻疼痛和预防感染,每次每公斤体重用青霉素 5~10IU,鱼腥草 0.5~1ml,首日加安痛定 10~20ml,肌肉注射。每日 2 次,连用 3~5d。如排粪困难时,每隔 3~6h 用温肥皂水灌肠,并用手指取出直肠内积粪,灌入油剂,使粘膜滑润以利排粪。术后加强护理,禁止病畜倒卧,并给营养丰富、易消化的饲料,一般 5~7d 即可痊愈。

5 体会

脱肛或直肠脱出,病程长脱出表面的粘膜易感染、水肿、干裂以及坏死。因此,病畜脱肛或直肠脱出应早发现早治疗,不仅手术简单易行,而且恢复时间短,只要术后精心护理,控制住并发症,就能达到理想效果。

* 作者简介:陈贵华(1970-),男,汉族,中专,兽医师。